



ROSA VILLOSA.

*R. Germinibus globosis pedunculisque hispidis, caule aculeis sparsis, petiolis aculeatis, foliis tomentosis.* L. *sp. pl.* 704. WILLD. *spec.* 2, pag. 1069. THUILLIER. *Fl. de Paris, ed. alt.* p. 251. POIRET. *Enc.* v. 6, p. 285, n° 14. D. C. *Fl. Franç.* n° 3700. NOUV. DUHAMEL. vol. 7, p. 44. RAU. *Enum. Ros.* pag. 150, n° 23. *Var. z.*

*R. Villosa (pomifera).* PERS. *Syn.* 16. DESV. *Journ. de Bot.* 1813, p. 117, *Var. γ.*

LE ROSIER VELU.

DESCRIPTION.

On distingue aisément ce Rosier aux poils moux, nombreux, couchés, et grisâtres, qui recouvrent les folioles de ses feuilles, ainsi qu'à ses fruits hérissés et très-gros, qui l'ont fait appeler *Rosier à Pommes*.

Ses tiges s'élèvent à plus de douze pieds: elles sont armées d'aiguillons épars, presque droits, et grisâtres. Les feuilles se composent de cinq ou sept folioles doublement dentées, douces au toucher, cotonneuses des deux côtés, et portées par des pétioles tomenteux, souvent garnis de quelques petites épines très-courtes. Les fleurs, légèrement odorantes, deux ou trois ensemble à l'extrémité des rameaux, sont supportées par des pédoncules hérissés, ainsi que les ovaires, de poils subulés en forme d'alène, roides et glanduleux. Les lobes du calice, un peu pinnatifides, pubescents, munis de quelques glandes, se prolongent en une longue pointe souvent aplatie, et comme